



INFORMAZIONI E REGOLE DA SEGUIRE PER LA COLONSCOPIA PREPARAZIONE CON PLENVU

MODALITÀ DI ASSUNZIONE IN BASE ALL'ORARIO DELLA COLONSCOPIA

COLONSCOPIA **FINO ALLE** ORE 14

3 giorni prima dell'esame

Non mangiare legumi, frutta, verdura ed alimenti contenenti semi (es. pane al sesamo).

Il giorno prima dell'esame

Si può consumare una leggera colazione seguita da un pasto leggero (pastina in brodo o yogurt magro senza frutta) da completarsi entro le ore 14. La cena deve essere costituita esclusivamente da dieta idrica con liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla, tisane). Non bere alcool, latte e nulla di colore rosso o viola o qualunque altra bevanda contenente polpa.

Ore 19.00 –19.30

Bere la dose 1 di PLENVU nell'arco di 30 minuti (vedi le istruzioni di preparazione illustrate sul retro).

Dopo aver terminato la dose 1 (indicativamente 19.30 – 20.00):

Bere **ALMENO** un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla, tisane) nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

Il giorno dell'esame

DIGIUNO (non è permessa la colazione, è consentita tuttavia l'assunzione di liquidi chiari fino a 2 ore prima dell'esame).

4 ore prima dell'inizio dell'esame

Bere la dose 2 di PLENVU nell'arco di 30 minuti (vedi le istruzioni di preparazione illustrate sul retro).

Dopo aver terminato la dose 2

Bere **ALMENO** un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla, tisane) nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

2 ore prima dell'inizio dell'esame

Interrompere l'assunzione di tutti i liquidi.

COLONSCOPIA **DOPO LE** ORE 14

3 giorni prima dell'esame

Non mangiare legumi, frutta, verdura ed alimenti contenenti semi (es. pane al sesamo).

Il giorno prima dell'esame

Si può consumare una leggera colazione seguita da un pasto leggero (pastina in brodo o yogurt magro senza frutta) da completarsi entro le ore 14. La cena deve essere costituita esclusivamente da dieta idrica con liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla, tisane). Non bere alcool, latte e nulla di colore rosso o viola o qualunque altra bevanda contenente polpa.

Il giorno dell'esame

Ore 7.00: DIGIUNO (non è permessa la colazione, è consentita tuttavia l'assunzione di liquidi chiari fino a 2 ore prima dell'esame).

Bere la dose 1 di PLENVU nell'arco di 30 minuti (vedi le istruzioni di preparazione illustrate sul retro).

Dopo aver terminato la dose 1 (indicativamente alle ore 7.30)

Bere **ALMENO** un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla, tisane) nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari e si sente lo stimolo della sete.

4 ore prima dell'inizio dell'esame:

Bere la dose 2 di PLENVU nell'arco di 30 minuti (vedi le istruzioni di preparazione illustrate sul retro). Deve essere passata almeno un'ora dal termine della dose 1.

Dopo aver terminato la dose 2:

Bere **ALMENO** un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla, tisane) nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari e si sente lo stimolo della sete.

2 ore prima dell'inizio dell'esame

Interrompere l'assunzione di tutti i liquidi.



ISTRUZIONI DI PREPARAZIONE DELLE DUE DOSI

PLENVU si presenta in una confezione che contiene due dosi.

Dose 1: una bustina singola

Dose 2: due bustine diverse, A e B, incollate tra di loro (da utilizzarsi insieme)



Dose 1



Dose 2

Come preparare PLENVU Dose 1


1. Aprire la scatola ed estrarre la bustina "Dose 1".
2. Versare il contenuto della Dose 1 in un recipiente che possa contenere ½ litro di liquido.
3. Aggiungere acqua fino a raggiungere ½ litro e mescolare fino a che tutta la polvere sia completamente sciolta.



Dopo aver assunto la dose di PLENVU, bere **ALMENO** un altro ½ litro di liquidi chiari nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

Come preparare PLENVU Dose 2

1. Estrarre la "Dose 2" dalla scatola; versare il contenuto della Bustina A e della Bustina B della Dose 2 in un recipiente che possa contenere ½ litro di liquido.
2. Aggiungere acqua fino a raggiungere ½ litro e mescolare fino a che tutta la polvere sia completamente sciolta.



Dopo aver assunto la dose di PLENVU, bere **ALMENO** un altro ½ litro di liquidi chiari nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

NOTA BENE: NON INVERTIRE la sequenza delle dosi

AVVERTENZE

- In caso di stitichezza (feci dure con frequenza inferiore a 3 volte la settimana) chiedere consiglio al medico per valutare l'aggiunta di un lassativo osmotico a base di Macrogol nei 2-3 giorni precedenti l'inizio della preparazione.
- Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti od antiaggreganti chiedere consiglio al medico per valutarne la continuazione o modifiche dell'assunzione. Non assumere altri medicinali per via orale fino ad un'ora dopo l'assunzione di PLENVU in quanto potrebbero essere eliminati dal tratto gastro-intestinale senza venire assorbiti.

CONTROINDICAZIONI

PLENVU è controindicato nei pazienti affetti da fenilchetonuria (per la presenza di fenilalanina) e nei pazienti con carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi = favismo (per la presenza di acido ascorbico/ascorbato).



Casa di Cura Privata Piacenza S.p.A.

Direttore Sanitario: Prof. Mario Sanna

T10 PA23 REV. 0

PREPARAZIONE COLONSCOPIA DIAGNOSTICA

Data Emissione: 12/10/2023

Data Revisione:

Pagina: 3 di 3

1. Portare gli eventuali referti di esami endoscopici o radiologici già effettuati e l'elenco delle medicine che si stanno assumendo.
2. **I pazienti che stanno assumendo farmaci anticoagulanti (Sintrom, Coumadin) o i portatori di pace-maker, devono avvisare il Medico Specialista prima dell'esame.**
3. Prima dell'esame endoscopico occorre firmare il **consenso informato**.
4. Durante la pancoloscopia può essere praticata una **sedazione cosciente** per cui **il paziente deve essere accompagnato e in questo caso dopo l'esame non potrà guidare alcun veicolo.**

AVVEVRTENZE

1. **Si deve assumere tutto il prodotto per la pulizia intestinale secondo le modalità indicate altrimenti l'esame non potrà essere eseguito correttamente e/o completamente.**
2. Nei pazienti con stipsi cronica severa e ostinata, la preparazione va ripetuta per 2 giorni consecutivi.
3. L'esame endoscopico abitualmente esplora tutto il colon per cui si parla di **pancoloscopia** e solo per motivi particolari (presenza di stenosi o altro) viene effettuato un esame parziale tipo **colonscopia sinistra** (studio colon sinistro) o **rettosigmoidoscopia** (studio del retto-sigma).