



Casa di Cura Privata Piacenza S.p.A.
Direttore Sanitario: Prof. Mario Sanna

T15 PA16 REV. 2
PREPARAZIONE ENTERO RM CON MDC

Data Emissione: 15/09/2020

Data Revisione: 07/02/2025

Pagina: 1 di 1

ENTERO-RM CON MDC

Per l'esecuzione della risonanza delle anse intestinali è necessario eseguire la seguente **preparazione il giorno precedente l'esame**:

ORE 13.00: Pranzo leggero – seguire una dieta priva di scorie (evitare frutta, verdura, legumi)

ORE 16.00: 1 Litro di acqua con SELG-ESSE (1 Bustina da 70g)

ORE 17.00: 1 Litro di acqua con SELG-ESSE (1 Bustina da 70g)

ORE 18.00: 1 Litro di acqua con SELG-ESSE (1 Bustina da 70g)

ORE 20.00: Cena solamente con brodo vegetale filtrato e liquidi eventualmente zuccherati. Sono vietati liquidi gassati, succhi di frutta e/o preparazioni industriali.

IMPORTANTE:

È indispensabile assicurarsi presso il medico curante che non ci siano controindicazioni all'assunzione di BUSCOPAN (glaucoma, ipertrofia prostatica, aritmie cardiache, ...).

Il giorno dell'esecuzione dell'esame è necessario presentarsi:

- **A DIGIUNO DA ALMENO 6 ORE** rispetto all'appuntamento concordato per l'esame (è possibile bere acqua);
- munito di **PRESCRIZIONE MEDICA** per l'esame prenotato;
- munito di referti di **VISITE ed ESAMI PRECEDENTI** eventualmente eseguiti inerenti all'indagine da eseguire;
- con un **ANTICIPO DI 1 ORA** rispetto all'orario dell'esame.

Eventuali terapie mediche possono essere continuate il giorno dell'esame.

Occorre presentarsi 60 minuti prima dell'esecuzione dell'esame e portare con sé:

- **1 bustina da 70g di SELG-ESSE** (da assumere 30 minuti prima dell'esame)
- **L'esame del sangue creatinina;**
- **1 bottiglia d'acqua NATURALE da 1 litro.**

I PAZIENTI CHE RIFERISCONO ALLERGIE A FARMACI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A TERAPIA DESENSIBILIZZANTE

(previa consultazione medico curante)

GASTROPROTETTORE (es. lansoprazolo, pantoprazolo, ecc.)

1 cp 24 ore prima dell'esame

DELTACORTENE 25 mg

1 cp 24 ore prima dell'esame

1 cp 8 ore prima dell'esame

ZIRTEC 10 mg

1 compressa 2 ore prima dell'esame

1 compressa 4 ore dopo l'esame